

## KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile hasat arasındaki süre
Pamuk*	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	150 ml / da Larva	7 gün
Elma	Elma iç kurdu ( <i>Cydia pomonella</i> )	20 ml / 100 L su Larva	3 gün
Bağ**	Sakız Güvesi ( <i>Lobesia botrana</i> ) Bağ Maymuncuğu ( <i>Otiorhynchus spp.</i> )	20 ml / 100 L su Larva 25 ml / 100 L su Larva	7 gün
Misir	Misir koçankurdu ( <i>Sesamia spp.</i> ) Misir Kurdu ( <i>Ostrinia nubilalis</i> ) Bozkurt ( <i>Agrotis spp.</i> )	30 ml / da Larva 30 ml / da Larva 50 ml / da Larva	14 gün
Patates	Patates Böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> ) Bozkurt ( <i>Agrotis spp.</i> )	40 ml / da Larva ve Ergin 40 ml / 100 L su	3 gün
Şeker Pancarı	Pancar yaprak pireleri ( <i>Chaetocnema spp.</i> )	20 ml / da Ergin	3 gün
Domates	Yeşilkurt ( <i>Helicoverpa armigera</i> )	50 ml / da Larva	3 gün
Fındık	Fındık kurdu ( <i>Curculio nucum</i> )	50 ml / da Ergin	7 gün
Lahana	Lahana yaprak güvesi ( <i>Plutella xylostella</i> )	25 ml / da Larva	2 gün
Hububat	Kümil ( <i>Aelia spp.</i> )  Ekin kamburböceği ( <i>Zabrus spp.</i> )	45 ml / da  Kişlamoş ergin, 2.ve 5.dönem nimf ve yeni nesil ergin 50 ml / da Larva dönemi yeşil aksam ilaçlaması	14 gün
Zeytin	Zeytin Güvesi ( <i>Prays oleae</i> ) Zeytin Sineği ( <i>Bactrocera oleae</i> ) Zeytin Karakoşnili ( <i>Saissetia oleae</i> ) Zeytin Pamuklubiti ( <i>Euphyllura olivina</i> )	15 ml / 100 L su Çiçek nesli 30 ml / 100 L su 30 ml / 100 L su Larva 30 ml / 100 L su	3 gün

\* Karate Zeon Akdeniz Bölgesinde pamukta kullanılmaz.

\*\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.