

İMAL TARİHİ:
SON KULLANMA TARİHİ:
ŞARJ NUMARASI:
RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI:

KULLANILACIĞI BİTKİ VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı Organizma / Hastalık adı	Kullanma Dozu ve Dönemi	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre
NARENCİYE	Pas Böcüsü (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	25 ml/100 l su	7 gün
	Yaprak galeri güvesi (<i>Phyllocnistis citrella</i>)		
SÜS BİTKİLERİ	Galeri sineği (<i>Lyriomyza trifolii</i>)	25 ml/100 l su	-
DOMATES	İki Noktalı Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/da	3 gün
PAMUK	İki Noktalı Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	50 ml/da	21 gün
ELMA	Avrupa Kırmızı Örümceği (<i>Pananyculus ulmi</i>)	75 ml/100 l su	7 gün
PATLICAN (Sera)	İki Noktalı Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su	3 gün
HIYAR (Sera)	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	25 ml/100 l su	3 gün
ÇİLEK	İki Noktalı Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 l su	3 gün
Biber (Sera)	Kırmızı Örümcek (<i>Tetranychus spp.</i>)	25 ml/100 l su	3 gün
Armut	Armut Psilidi (<i>Cacopsylla pyri</i>)	75 ml/100 l su	-

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI:

Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılır. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde, yeşil aksam ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda ilaçlamadan kaçınılmalıdır.

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Ağaç başına veya dekara kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli sayıda ağaç veya belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek ağaç başına veya dekara kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanır.

İlacın Hazırlanması: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce az miktardaki temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım yarı yarıya suyla dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. İlaçlı mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

KULLANIM ZAMANI VE ŞEKLİ:

Narenciye: İlaçlama pas böcüsü kesafeti görülür görülmez kullanılmalıdır. İyi bir ilaçlama için kaplama ilaçlama şarttır. Ağaç başına 10-20 lt mahlul yeterlidir. %0.25 oranında yazlık yağlarla karıştırılabilir. Galerî güvesi için taze sürgünde bulaşma tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanıp, yeni bulaşmalara göre 10-15 gün ara ile tekrarlanır.

Süs Bitkileri: İlk galerî belirtileri görülür görülmez ilaçlamaya başlanır. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir. İki ilaçlama arasında en az 7 gün ara olmalıdır.

Biber ve Pamuk: Yaprak başına ortalama 1-3 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılır.

Domates, Hiyar ve Patıcan: Yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

Elma: Yaprak başına ortalama 8-10 adet bireyi geçmesi durumunda ilaçlama yapılmalıdır.

Armut: Mart ayından itibaren yapılmaya başlanan kontrollerde, kışlayan döl erginlerinin bıraktığı yumurtaların hemen hemen tamamının açılıp iki ve üçüncü dönem nimfler görülmeye başladığı, tatlımsı madde akıntısının başlamadığı dönemde yapılan tek bir ilaçlama yeterlidir.

agrikem

AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

SAN. VE TİC. A.Ş.

ACTINMOR

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	6	İNSEKTİSİT-AKARİSİT
------	---	---------------------

Etkili Madde: 18 g/l Abamectin

%95 Avermectin B1a = Avermectin A1a 5-0 demethyl %5 Avermectin B1b = Avermectin A1b 5-0 demethyl 25'de (1 methylpropyl) 25 (1 methylethyl)

- ÖNCE ETİKETİ DİKKATLE OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN VE GIDA MADDELERİNDEN UZAKTA, KAPALI VE KİLİT ALTINDA TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.
- MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN, SİPERLİK, GÖZLÜK KULLANINIZ.
- İLAÇLAMA SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, SİGARA İÇMEYİNİZ.
- DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ
- TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLER DİŞİNDE KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Göz bebeklerinde büyüme, adalelerde koordinasyon bozukluğu ve kaslarda kasmaya neden olur.

İLYARDIM ÖNLEMLERİ

Zehirlenme halinde aşağıda belirtilen ilk yardım tedbirlerini alınız.

Göz teması halinde: En az 15 dakika süreyle bol su ile yıkayınız. Derhal tıbbi yardım alınız

Deriye teması halinde: İlaç ile bulaşık elbiseleri çıkarınız ve temas eden kısımları su ve sabunla yıkayınız.

Solunması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarınız. Gerekirse suni teneffüs yaptırınız.

Yutulması halinde: Maruz kalan kişiyi hemen kusturunuz. Derhal tıbbi yardım alınız.

Çilek: Hareketli dönemde yaprakçık başına ortalama 10 veya üzerinde kırmızı örümcek görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır.

ANTİDÖTÜ, TEDAVİSİ VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi yapılır. Zehirlenme halinde hasta 30 dakika içerisinde kusturulmalıdır. Tıbbi kömür verilmelidir. GABA'yı hızlandırıcı ilaçları (Barbiturate, Benzodiazepin, Valproic acid) verilmemelidir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ ÜZEM, TEL: 1544

31 Ağustos 2019

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI:

TEHLİKE ÖZELLİĞİ:
Xn: Zararlı

TEHLİKE SEMBOLÜ:



Xn-Zararlı

İÇİNDEKİLER:

Abamectin ve diğer katkı maddeleri

UYGULAYICI VE ÇEVRE İLE İLGİLİ RİSK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- R10 Alevlenir
R20/21 Solunması ve cilt ile temasında zararlıdır.
R22 Yutulması halinde zararlıdır.
R36/38 Gözleri ve cildi tahriş eder.

GÜVENLİK İBARESİ VE AÇIKLAMASI

- S1/2 Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.
S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Anılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- İlaç yanabilir özellikte olduğu için ateşten uzakta tutunuz.
- Rüzgârlı havalarda ilaçlama yapmayınız.
- Mahlülün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- Bekleme süresine uyunuz.
- İlacın dökülmesi halinde üzerine kum, toprak, vb. gibi emici madde dökünüz daha sonra ilacı emmiş bu maddeyi süpürüp toplayıp imha ediniz.
- Boş ambalajları herhangi bir gaye için kullanmayınız, boş ambalajlar usulüne uygun olarak imha edilmelidir.

DEPOLAMA DURUMU

ACTINMOR orijinal ambalajında, gıdalardan uzakta, çocukların ve hayvanların erişemeyeceği bir yerde, serin ve kuru ortamda, güneş ışınlarından uzak bir alanda kilit altında depolanmalıdır. Normal depolama şartlarında ve orijinal ambalajında açılmadan depolandığı takdirde fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde en az iki yıl değişiklik olmaz.

AGRIKEM

Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Kazım Dirik Mah. 372 Sk. No: 3 Bornova - İZMİR
Tel: 0 232 374 42 00 Fax: 374 49 28
Tic.Sic.No: Bornova 6169 - Bornova V.D. 098 080 2822

DİRENÇ YÖNETİMİ

ACTINMOR adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grubu 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisit / akarisit'tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek ACTINMOR 'nın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup:6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ilaçlarla karışabilirlik durumu uygulayıcı sorumluluğunda kontrol edilmelidir.

agrikem

AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

SAN. VE TİC. A.Ş.

ACTINMOR

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUP	6	İNSEKTİSİT-AKARİSİT
------	---	---------------------

Etkili Madde: 18 g/l Abamectin

%95 Avermectin B1a = Avermectin A1a 5-0 demethyl %5 Avermectin B1b = Avermectin A1b 5-0 demethyl 25'de (1 methylpropyl) 25 (1 methylethyl)

FİRMA BEYANI

İlacın normal depolama şartlarında saklanması ve açılmamış orijinal ambalajında satılması şartı ile kalitesini garanti ettiğimizi, hatalı depolama veya hatalı uygulama ve tavsiyelere uymadaki eksiklik sonucu oluşacak zarar için sorumluluk kabul etmeyeceğimizi beyan ederiz.

İMALATÇI FİRMA:

AGRIMOR IL Ltd.

20 Korçak St., Hertzelyia, 46309, İSRAİL

Tel: + 972 9 9581196

Fax: + 972 9 9516160

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA

AGRIKEM ZİRAAT İLAÇLARI ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

SAN. VE TİC. A.Ş.

Kazım Dirik Mah. 372 Sk. No:3 Bornova/İZMİR

Tel:+90 232 374 42 00 Fax:+90 232 374 49 26

AGRIKEM

Ziraat İlaçları Endüstri Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
Kazım Dirik Mah. 372 Sk. No: 3 Bornova - İZMİR
Tel: 0 232 374 42 00 Fax: 374 49 26
Tic.Sic.No: Bornova-6109 - Bornova V.D. 008 060 2822

31 Mayıs 2016
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR
Yardımcısı V.



[Handwritten signature]