

## Goldplan® 20 SP

Suda Eriyebilir Toz (SP)

Grubu **4 A** İNSEKTİSİT ( Böcek İlacı )

% 20 Acetamiprid

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi : (Ay ve yıl olarak)  
Şarj numarası : (damga)  
Ruhsatname tarihi ve numarası: 22.09.2004/4834

### KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
PAMUK	Yaprakbiti ( <i>Aphis gossypii</i> )	10 g/da (nimf, ergin)	0 gün
	Yaprakpireleri ( <i>Empoasca decipiens</i> , <i>Asymmetrasca decedens</i> )	10 g/da (nimf, ergin)	0 gün
	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	40 g/da (larva, ergin)	0 gün
TÜTÜN (Ege, Marmara)	Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> )	10 g/da (nimf, ergin)	10 gün
PATATES	Patates böceği ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )	6 g/da (larva, ergin)	7 gün
DOMATES (tarla)	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	30 g/da (larva, ergin)	3 gün
DOMATES (sera)	Sera beyazsineği ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )	30 g/100 L su (larva, ergin)	3 gün
ANTEPFİSTİĞİ	Antepfıstığı psillidi ( <i>Agonoscena pistaciae</i> )	20 g/100 L su (ergin, nimf)	7 gün
ELMA	Yeşil yaprakbiti ( <i>Aphis pomi</i> )	20 g/100 L su (ergin, nimf)	14 gün
BİBER (örtü altı)	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	30 g/100 l.su (larva, ergin)	3 gün
	Sera beyazsineği ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )		
HIYAR (örtü altı)	Tütün beyazsineği ( <i>Bemisia tabaci</i> )	30 g/100 l.su (larva, ergin)	3 gün
	Sera beyazsineği ( <i>Trialeurodes vaporariorum</i> )		
KARPUZ	Şeftali yaprakbiti ( <i>Myzus persicae</i> )	25 g/da (ergin, nimf)	7 gün

- Önce Etiketini Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

### TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- Bitki Koruma Ürününün Buharını veya Zerrelerini Solumayınız.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Hareketlerde uyuşukluk, adale kasılmaları, denge bozukluğu, solunum azalması, gözyaşı ve sümük artışı, vb. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Solunması halinde:** Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Tıbbi yardım alın. Solunum zorluğu çekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir.

**Yutulması halinde:** Hemen tıbbi yardım alın. Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

**Cilt ile teması halinde:** Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi su ve sabun ile iyice yıkayın. Yıkamadan sonra tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

**Göz ile teması halinde:** Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin. Gözlerinizi ovmayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktarı: (kg veya L)

Azami perakende satış fiyatı:

İçindekiler: Acetamiprid, Amonyum klorür

### Zararlılık işaretleri:



Uyarı Kelimesi: DİKKAT

### Zararlılık ifadeleri (H)

H302	Yutulması halinde zararlıdır.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.

### Önlem ifadeleri (P)

EUH208 içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.	
P280	Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın.
P501	İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401	İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Tavsiye dozunda fitotoksik değildir.

### RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR  
Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71  
www.agrobestgrup.com

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

29 Haziran 2017

Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.

agrobest  
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk  
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

Sayfa 1 / 3

## Goldplan® 20 SP

Suda Eriyebilir Toz (SP)

Grubu	4 A	İNSEKTİSİT ( Böcek İlacı )
-------	-----	----------------------------

% 20 Acetamiprid

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:** Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcısı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

**Özellikleri:** BKÜ sistemik etkilidir. Uygulamadan kısa bir süre sonra bitki bünyesine geçer. Etki süresi 14 ila 21 gün.

**Uygulama zamanı:** Uygulama sabah çiğ kalktıktan sonra veya akşam serinliğinde yapılmalıdır. Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağarsa uygulama tekrarlanmalıdır. Aynı yetiştirme periyodunda 2'den fazla uygulama yapılmamalıdır.

**Domates, Biber, Hıyar (Tütün beyazsineği, Sera beyazsineği):** Tütün beyazsineği ve sera beyazsineği ile bulaşık olduğu saptanan seraya/tarlaya köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda mücadeleye başlanır.

**Patates böceği:** Örnekleme için tarlaya köşegenleri istikametinde girilerek, zararlının yumurta, larva ve erginleri aranır. Zararlının herhangi bir dönemine rastlanması o tarlanın bulaşık olduğunu gösterir. Birinci döle karşı uygulama yapılacaksa, bitkilerde ilk olgun larvalar (dördüncü dönem) görüldüğünde yapılmalıdır. İkinci döle karşı uygulama yapılması durumunda ise yumurta açılımının tamamlanması gerekir. Bu dönemde de, böcek yoğunluğuna bağlı olarak meydana gelecek zarar bitki tarafından tolere edilebileceğinden, uygulama gerekemeyebilir.

**Antepfıstığı psillidi:** Haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında, ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

### DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajında satılmak kaydıyla imalatçılar Bitki Koruma Ürününün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar Bitki Koruma Ürünlerinin hatalı depolanması ve uygulamadaki eksiklikler neticesinde oluşacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

### RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA

Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR


Tel: 0232 877 17 70, Fax: 0232 877 17 71

[www.agrobestgrup.com](http://www.agrobestgrup.com)

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR

29 Haziran 2017

  
Dr. Yunus KAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.

  
agrobest®  
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk  
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410

## Goldplan® 20 SP

Suda Eriyebilir Toz (SP)

Grubu	4 A	İNSEKTİSİT ( Böcek İlacı )
-------	-----	----------------------------

% 20 Acetamiprid

**Elmada yeşil yaprakbiti:** Vejetasyon süresi boyunca 100 sürgünden 15'inde bulaşıklık olursa uygulama yapılmalıdır.

**Karpuz Şeftali yaprakbiti:** Uygulama zamanını saptama amacı ile Nisan ayından itibaren tarlaya köşegenler doğrultusunda girilerek 3-5 adımda bir, bitkilerin taze yaprak ve sürgünlerinde tesadüfi olarak birer yaprak koparılır. Karpuz gibi büyük yapraklı bitkilerde bir yaprağa düşen yaprakbiti sayısı 10-20 adet ise uygulamaya başlamak gerekir.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

**Goldplan 20 SP** adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 4 A** olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **Goldplan 20 SP'nin** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 4 A harici**) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Alkali özelliktekiler hariç diğer insektisit, fungusit ve yaprak gübrelere ile karıştırılarak uygulanabilir.

**RUHSAT SAHİBİ ve İMALATÇI FİRMA**  
Agrobest Grup Tar.İl.Toh.İml.İth.İhr.San.Tic.A.Ş.  
Atatürk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:61 Ulucak-Kemalpaşa/İZMİR  
**Tel:** 0232 877 17 70, **Fax:** 0232 877 17 71  
[www.agrobestgrup.com](http://www.agrobestgrup.com)

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
**KABUL EDİLMİŞTİR**

29 Haziran 2017

  
Dr. Yunus BAYRAM  
Genel Müdür Yardımcısı V.

  
agrobest®  
GRUP

Agrobest Grup Tarım İlaçları Tohumculuk  
İmalat İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret  
Anonim Şirketi V.N. 008 081 1410