

KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR

Bitki Adı	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre(gün)
PATATES	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)		
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Bambul otu (<i>Heliotropium europaeum</i>)		
	Sarmaşık çoban değneği (<i>Polygonum convolvulus</i>)		
	Açı ot (<i>Solanum dulcamara</i>)	50-75 g/da	42
	Fare kulağı (<i>Veronica sp.</i>)		
	Senelik köpek lahanası (<i>Mercurialis annua</i>)		
DOMATES	Kaz ayağı (Sirken) (<i>Chenopodium album</i>)		
	Büyük pitrak (<i>Xanthium macrocarpum</i>)		
	Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>)		
	Yapışkan ot (<i>Setaria spp.</i>)		
	Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>)		
SOYA	Semiz otu (<i>Portulaca oleracea</i>)		
	Horoz ibiği (<i>Amaranthus spp.</i>)	50-75 g/da	42
	Kaz ayağı (Sirken) (<i>Chenopodium album</i>)		
	Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>)		
	Semizotu (<i>Portulaca oleraceae</i>)	50 g/da	
	Alçak sütleğeni (<i>Euphorbia prostrata</i>)	(ekimden hemen sonra)	
	Kırmızı köklü tilki kuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>)		
	Bayır turpu (<i>Raphanus raphanistrum</i>)		